


Préfectures japonaises

JP-01 Hokkaido 北海道
JP-02 Aomori 青森県
JP-03 Iwate 岩手県
JP-04 Miyagi 宮城県
JP-05 Akita 秋田県
JP-06 Yamagata 山形県
JP-07 Hukusima (Fukushima) 福島県
JP-08 Ibaraki 茨城県
JP-09 Totigi (Tochigi) 栃木県
JP-10 Gunma 群馬県
JP-11 Saitama 埼玉県
JP-12 Tiba (Chiba) 千葉県
JP-13 Tokyo 東京都
JP-14 Kanagawa 神奈川県
JP-15 Niigata 新潟県
JP-16 Toyama 富山県
JP-17 Isikawa (Ishikawa) 石川県
JP-18 Hukui (Fukui) 福井県
JP-19 Yamanasi (Yamanashi) 山梨県
JP-20 Nagano 長野県
JP-21 Gihu (Gifu) 岐阜県
JP-22 Sizuoka (Shizuoka) 静岡県
JP-23 Aiti (Aichi) 愛知県
JP-24 Mie 三重県
JP-25 Siga (Shiga) 滋賀県
JP-26 Kyoto 京都府
JP-27 Osaka 大阪府
JP-28 Hyogo 兵庫県
JP-29 Nara 奈良県
JP-30 Wakayama 和歌山県
JP-31 Tottori 鳥取県
JP-32 Simane (Shimane) 島根県
JP-33 Okayama 岡山県
JP-34 Hirosima (Hiroshima) 広島県
JP-35 Yamaguti (Yamaguchi) 山口県

JP-36 Tokusima (Tokushima) 徳島県
JP-37 Kagawa 香川県
JP-38 Ehime 愛媛県
JP-39 Koti (Kochi) 高知県
JP-40 Hukuoka (Fukuoka) 福岡県
JP-41 Saga 佐賀県
JP-42 Nagasaki 長崎県
JP-43 Kumamoto 熊本県
JP-44 Oita 大分県
JP-45 Miyazaki 宮崎県
JP-46 Kagosima (Kagoshima) 鹿児島県
JP-47 Okinawa 沖縄県



Préfectures japonaises

L'IRSN recommande dans son bulletin du 20 avril dernier (http://www.irsn.fr/FR/Actualites_pr/Actualites/Documents/IRSN_Residents-Japon_Bulletin4_20042011.pdf) :

- d'éviter de consommer de l'anguille des sables ou lançon japonais.
 - d'éviter de consommer les légumes (épinards, hana wasaki, kakina, komatsuna, laitue, chrysanthème, chou, chou blanc, céleri, brocolis, bok choy, persil) et les champignons produits dans les préfectures de Fukushima, Tochigi, Ibaraki et Miyagi, Gunma ;
 - d'éviter de donner aux enfants du lait frais produits depuis le 11 mars dans les préfectures de Fukushima, Tochigi, Ibaraki et Miyagi, Gunma ;
 - de s'assurer que les denrées fraîches listées ci-dessus provenant de préfectures où des dépassements des normes autorisant la consommation ont été observés pour ces produits (Saitama, Tokyo, Kanagawa, Chiba) sont conformes à la réglementation japonaise en vigueur ;
 - en l'absence d'information sur la provenance et la qualité radiologique des denrées fraîches, de varier son alimentation en évitant, autant que possible, la consommation prolongée de légumes à feuilles (épinards, hana wasaki, kakina, komatsuna, laitue, chrysanthème, chou, chou blanc, céleri, brocolis, bok choy, persil).
- Aucune limitation